



PREPARAÇÃO PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA - TAC

WWW.ARRIFANADESOUSA.PT

O exame que vai realizar, implica que determinadas condições preparatórias sejam cumpridas completamente. Desta maneira, conseguiremos que o resultado obtido seja o mais correcto possível.

VÉSPERA DO EXAME

Nada a referir.

DIA DO EXAME

Fazer Jejum durante 4 (quatro) horas.

IMPORTANTE

Deve fazer-se acompanhar dos exames complementares que tenha em sua posse.

Se o seu exame for Abdominal, Pélvico, ou Renal, deverá apresentar-se 30 minutos antes da hora marcada.

LOCAL DO EXAME NA CMAS

Penafiel | piso -4



O QUE É?

A Tomografia Computorizada (TAC) é uma técnica que permite obter imagens com alta definição, muitas vezes fundamentais para o diagnóstico de algumas doenças, através de um equipamento complexo de raios X.

COMO É QUE É REALIZADO?

O doente tem que se deitar numa marquesa que desliza em pequenos avanços na "gantry" (túnel do equipamento). À medida que vai deslizando, vão sendo captadas imagens dos vários segmentos do corpo, que posteriormente são processadas num computador. A duração do exame é de 15-30 min, variando consoante a parte do corpo a ser analisada.

Por vezes pode ser necessário a injeção intravenosa de um medicamento de contraste, que permite uma melhor interpretação das imagens capturadas.

ANTES DE REALIZAR O EXAME:

Deve informar o seu médico:

Sobre o seu historial clínico, principalmente se tem insuficiência renal, hipertiroidismo, diabetes ou doenças cardiovasculares ou cerebrais;

Sobre a medicação que está a tomar (como por exemplo medicação para os Diabetes; antidepressivos...);

Se já tiver tido episódios de alergias a medicamentos, alimentos ou outras substâncias, ou se tiver asma.

Caso seja diabético, contacte-nos antecipadamente para o telefone 255 718 110.

EFEITOS ADVERSOS:

A TAC é um exame indolor e os riscos associados são mínimos. No entanto podem ocorrer efeitos adversos, sendo o mais frequente a dor, hematoma, prurido e/ou rubor no local da injeção do contraste. Com menor frequência podem ocorrer episódios de náuseas, vómitos e diarreia.

Complicações mais graves foram raramente notificadas.

CONSIDERAÇÕES:

Antes do exame deverá fazer uma hidratação adequada, mas deve suspender o consumo de alimentos e líquidos 4 horas antes de exame.

É importante que retire todos os objetivos metálicos quando fizer o exame, uma vez que podem alterar a definição da imagem capturada.

Após a administração do contraste é importante ficar sob observação na unidade clínica durante pelo menos 30 min.

CONTRAINDICAÇÕES

Este exame encontra-se contraindicado em casos de gravidez ou suspeitas de gravidez, sendo que nestas situações a relação risco/benefício deve ser cuidadosamente avaliada.



CLÍNICA MÉDICA

Rua Fonte do Carvalho . 4560-466 Penafiel . t. 255 718 100
ERS: E111353 – 3456/2011

WWW.ARRIFANADESOUSA.PT

PENAFIEL | LOUSADA | MARCO DE CANAVESES | ALPENDORADA | VILA MEÃ | PAREDES